

Alkyl Acyl Transferase Activity Assay Kit

醇酰基转移酶 (AAT) 活性说明书

货号: BN72174 | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

醇酰基转移酶 (AAT, EC 2.3.1.84) 是酯类化合物生物合成过程中的关键酶, 研究表明该酶活性与果实中酯类化合物的含量呈正相关。

醇酰基转移酶 (AAT) 催化乙酰 CoA 和醇类化合物生成酯类化合物和 CoA, 生成的 CoA 具有还原性并可与 DTNB 作用生成黄色物质, 该有色物质在 412nm 处有特征吸收峰, 即可得出 MS 酶活性大小。

二、试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	液体 6mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	液体 mL×1 支	4°C保存	临用前取出 40μL 的试剂二至新 EP 管中, 再加入 1.1mL 蒸馏水混匀备用。
试剂三	液体 1mL×1 支	4°C保存	若凝固, 可于 25°C水浴片刻至全部融解后使用。
试剂四	粉剂 mg×1 支	4°C保存	临用前甩几下使粉剂落入底部, 再加入 0.6mL 蒸馏水溶解, 可分装保存, 尽量避免反复冻融。
标准品	粉剂 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水

四、醇酰基转移酶 (AAT) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品和实验流程, 避免样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm 4°C离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10⁴): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 412nm。

② 所有试剂解冻至室温 (25°C), 在 96 孔板中依次加入:


试剂名称 (μL)	测定管
样本	50
试剂一	100
试剂二	20
试剂三	20
混匀, 30°C条件下孵育 10min, 立即于	

412nm 处读取吸光值 A1,	
试剂四	10
混匀, 30°C 条件下反应 30min, 立即于 412nm 处读取吸光值 A2, $\Delta A = A2 - A1$ 。	

注意: 本操作流程适用于绝大多数常规样本检测, 实验条件可根据实际样本状态适度微调;
针对特殊类型样本, 我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 0.0644x - 0.008$, x 是标准品质量: μg , y 是 ΔA 。



标准曲线示意图

说明: 标准曲线由标准品测定获得, 具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$\text{AAT}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = [(\Delta A + 0.008) \div 0.0644] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \div \text{Mr} \times 10^3 = 13.5 \times (\Delta A + 0.008) \div \text{Cpr}$$

3、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织每分钟催化产生 1nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$\text{AAT}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.008) \div 0.0644] \div (W \times V1 \div V) \div T \div \text{Mr} \times 10^3 = 13.5 \times (\Delta A + 0.008) \div W$$

4、按细菌或细胞密度计算:

酶活定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1 nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$\text{AAT}(\text{nmol}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.008) \div 0.0644] \div (500 \times V1 \div V) \div T \div \text{Mr} \times 10^3 = 0.027 \times (\Delta A + 0.008)$$

5、按照液体体积计算:

酶活定义: 每毫升液体样本每分钟催化产生 1 nmol 辅酶 A 定义为一个酶活力单位。

$$\text{AAT}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.008) \div 0.0644] \div V1 \div T \div \text{Mr} \times 10^3 = 13.5 \times (\Delta A + 0.008)$$

V1---加入样本体积, 0.05mL; V---加入提取液体积, 1mL; T---反应时间, 30min;

W---样本质量, g; CoA---Mr 分子量, 767.5; 500---细胞或细菌总数, 万;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。